



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Sektion Aids

World Aids Conference 2008

MEXICO

MSM



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Sektion Aids

Droits LGBTI dans le monde

ILGA, depuis 1978, l'unique fédération mondiale pour la défense des droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres et intersexués

Mai 2008

PERSÉCUTION:

- peine de mort : 7 pays
- peines de prison : 76 pays et 6 entités*


PROTECTION:

- lois antidiscriminatoires: 50 pays et 33 entités

RECONNAISSANCE:

- reconnaissance et enregistrement des unions entre partenaires de même sexe : 19 pays et 14 entités

* partie d'un État ou d'une fédération, province, district



Ces lois concernent les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles ainsi que les liaisons et les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Parfois, elles s'appliquent également aux personnes transgenres ou intersexués. Le projet de carte mondiale a été coordonné par Juris Lavricus (ILGA-Europe) et Stephen Barris (ILGA). La carte avait été dessinée à l'origine par Philippe Mouche pour Têtu et pour ILGA; des corrections ont été effectuées par Silja Pogule pour le magazine d'ILGA-Europe. Les données présentées sur cette carte sont tirées de Homophobia d'Etat. Une enquête mondiale sur les lois qui interdisent la sexualité entre adultes consentants de même sexe, un rapport de ILGA réalisé par Daniel Ottosson (disponible sur www.ilga.org en français, anglais, espagnol et portugais).



Quels liens avec le VIH?

Jorge Saavedra, chef du programme national VIH/sida au Mexique:

- La criminalisation de l'homosexualité, et l'homophobie limitent les HSH à accéder à la prévention VIH, à l'information, aux commodités, aux traitements et aux soins.
- Face aux sanctions légales et sociales, les HSH sont exclus, ou s'excluent d'eux-mêmes, des structures d'aide et de bien être sexuels.



- 10 fois plus de risque d'infection à VIH que la population générale.
- L'épidémie est en augmentation continue au niveau mondial.
- Pourtant, de nombreux pays ignorent cette réalité épidémique. Selon les rapports gouvernementaux rendus à UNAIDS à propos de leur système de surveillance nationale, seuls 31% des pays considèrent la question des HSH.



La répartition des ressources mondiales:

Carlos Caceres, WAC.


1% HSH

2% IDU

1% Sex Workers

96% Population générale

Répartition des ressources mondiales





Conséquences?

Jorge Saavedra, WAC

- Augmentation continue d'infection à VIH chez les HSH en Europe et autres pays industrialisés occidentaux.
- 2/3 des infections sont issues des HSH aux USA.
- Proportion plus élevée d'infection à VIH chez les HSH en Amérique latine.
- L'Afrique: HSH fortement stigmatisés, non reconnus, et entretiennent parallèlement des relations hétérosexuelles par pressions sociales.
- Observation du même « trend » en l'Asie du sud-est, Ukraine, Chine et l'Inde



En guise de conclusion:

- Les HSH forment un groupe des plus vulnérables!!!
- La vulnérabilité et les risques d'exposition aux risques d'infection à VIH chez les HSH sont aussi liés à la violation des droits des personnes, à la criminalisation de l'orientation sexuelle, à la stigmatisation, à la discrimination et à l'homophobie. (Jorge Saavedra)
- La répartition des ressources joue également un rôle dans la réponse à apporter à l'augmentation des nouvelles infections à VIH chez les HSH.



Et en Suisse?

- Pas de répression policière, militaire ou politique.
- Reconnaissance légale des couples de même sexe.
- Reconnaissance de la question des HSH dans le programme nationale VIH/sida.



Mais les dernières barrières semblent se trouver dans nos têtes!

- Éducation sexuelles dans les écoles.
- Polémique sur les campagnes nationales.
- Médecins « gay-friendly » et compétents en matière de santé gaie.
- Manque d'offres cantonales pour les HSH.
- La santé gaie est comparable à la santé des migrantEs.
- Demandes actuelles d'améliorer l'accès des migrantEs aux services de soin en Suisse. Quant est-il pour les HSH?
- Répartition des fonds? La proportion des investissements est-elle juste?



Quelle prévention VIH pour les HSH en Suisse demain?

- L'éducation sexuelle
- Apprendre à reconnaître les symptômes de primo-infection.
- IST (multiplier l'offre aux Checkpoint (plus de tests et de traitements)).

La prévention de demain doit aller au-delà du tout préservatif. La prévention doit fonctionner sur plusieurs niveaux:

- Safer sex
- Gestion et réduction des risques
- ART comme moyen de prévention
- Les ONG doivent définir maintenant leur stratégie face à l'arrivée prochaine de nouveaux moyens de prévention (PrEP, micobicide, etc.)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Sektion Aids

Et notre contribution à Mexico?

¿Vamos a la playa?



„Three Months of Absolute Safer Sex“



May be the Answer to the New Epidemic of HIV Among Gay Men in Western Countries

Roger Staub, Martin Wimmer, Steven Derendinger, Swiss Federal Office of Public Health
Thomas Bucher, Swiss AIDS Federation
Contact e-mail: roger.staub@bag.admin.ch


In 2008, 160 new diagnoses of HIV among gay men have been reported to the Swiss Federal Office of Public Health. Within 3 years, that number almost doubled, reaching 302 cases in 2007. More than 40% of these diagnoses were recent infections acquired within less than 6 months before testing. In parallel, behavioral data show a slow increase in risk-taking among MSM in Switzerland over the same period. But this does not fully explain the new outbreak of HIV among gay men since 2003.

Hypothesis: Individuals with primary HIV infection (PHI) are driving this PHI epidemic, which obviously cannot be detected in time, is transmitted within networks of men having unprotected anal intercourse (UAI), some being unaware of their PHI.

If the hypothesis is correct, the number of highly infectious people with PHI in the gay community has to be reduced to stop the epidemic.



see poster
"Mission Possible" TUPDC0359,
displayed Monday - Thursday
in front of some meeting rooms



The answer may be: No new HIV-infections during 3 months.

Therefore, the gay community should commit itself in collective action of "three months of absolute safer sex" during the same period of time to avoid new PHI. Meanwhile, people with former PHI will develop antibodies. After these three months of action, all gay men who want to have UAI within that relationship should first take an HIV test and receive counselling about correct risk-management. As a result, the rate of recent infections among new HIV diagnoses should drop significantly.

The Swiss AIDS Federation has launched its "Mission Possible!" campaign on 1st of February. An evaluation is taking place now. If Mission Possible worked in Switzerland a similar campaign should be considered in Europe to cover the major gay venues, such as Paris, Amsterdam, Berlin ...

With a significantly lower number of individuals with PHI, the level of protection showed by behavioral surveys should be sufficient to keep the level of new HIV infections among gay men at a "chronic" level.



Swiss AIDS-Links:

Check-your-Level-of-Risk
www.level.ch
LOVE LIFE STOP AIDS Campaign
Federal Office of Public Health
Swiss AIDS Federation

www.check-your-level.ch
www.level.ch
www.bag.admin.ch/aids
www.aids.ch

Issues

In Switzerland the number of new infections among MSM has increased continuously since 2003. The Federal Office of Public Health has measured a model able to stop this epidemic (see poster TUPDC0359 "Three Months of Absolute Safer Sex" exhibited on Thursday in hall 3). The model is based on the hypothesis that individuals

with primary HIV infection (PHI) who have unprotected anal intercourse (UAI) within networks of familiar sex partners are driving this epidemic. Evidence for this hypothesis are research findings showing that about 50% of HIV positive MSM get infected by a partner with PHI. In order to verify this hypothesis, the Swiss AIDS Federation (SAF) launched the "MISSION POSSIBLE!" campaign (MP).

Goals of MP

MP's goal was to motivate all MSM in Switzerland to practice safer sex strictly for three months and act the same towards 2008 new PHI. Men who want to have UAI after these three months should first take a HIV

test and receive counselling about negotiated safety and correct risk management. We expect a significant drop of recent infections among MSM with a new HIV diagnosis. The goal of MP was considered to 3 steps.

Step 1: All you need to know about PHI

November 07 to January 08

MSM were informed about PHI and its implication in HIV transmission. A collective action of "3 Months of Absolute Safer Sex" was announced. The gay community was motivated to commit itself to this relation. Brochures and internet were used.



Step 2: Join the mission!

February 1st to May 1st 08

MSM were encouraged to participate in the collective action "3 MONTHS ABSOLUTELY SAFE!". The action was promoted by a massive campaign involving personal communication and all media in all places where MSM meet. Free condoms with MP-design were distributed to all venues of bathhouses, darkrooms and sex clubs.



Step 3: I want to know now!

May 1st to May 31 08

Promotion of VCT and negotiated safety. Participants of MP were offered a free voucher for a VCT-appointment in a test center special bed for gaymen. After 3 months of safer sex it was the perfect time for those who wanted to have UAI with their stable partners.

Lessons learned

It is difficult to explain the meaning of a collective safer sex action of 3 months to MSM because prevention messages stay the same for the individual after these 3 months.

Next steps

MSM are educated after MP to recognize signs of PHI, to have more efficient preventive strategies and to practice negotiated safety. A formal evaluation of MP is going on and will be presented in 2009.

Swiss AIDS-Links

www.level.ch
www.bag.admin.ch/aids
www.aids.ch

Swiss AIDS Federation
Mission Possible Campaign
LOVE LIFE STOP AIDS Campaign



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Sektion Aids

Merci