
















# Aperçu des médicaments antirétroviraux

Les médicaments anti-VIH


Médicaments homologués en Suisse (2014)

Nom générique	Nom commercial	Forme	Dose standard chez l'adulte	Cpr./jour	Effets indésirables fréquents	Prise avec/sans/avant un repas	
<b>Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI/INtTI)</b>							
<b>3TC, lamivudine</b>	3TC (générique: Lamivudin Teva)		Comprimés: 150 mg, 300 mg	150 mg, 2x/j <b>ou</b> 300 mg, 1x/j	<b>2</b> <b>1</b>	Céphalées, toux, inflammations de la gorge, du nez ou des oreilles, symptômes nasaux tels que congestion nasale, rhinorrhée et éternuements, diarrhée, vomissements, éruption cutanée	indifférent
<b>Abacavir (ABC)</b>	Ziagen		Comprimés: 300 mg	300 mg, 2x/j <b>ou</b> 600 mg, 1x/j	<b>2</b>	Réactions d'hypersensibilité, vomissements, céphalées, nausées, diarrhée, manque d'appétit, fatigue, manque de force, fièvre (élévation de la température corporelle), éruption cutanée	indifférent
<b>AZT, zidovudine</b>	Retrovir AZT		Capsules: 250 mg	250 mg, 2x/j	<b>2</b>	Réduction du nombre de certains types de cellules sanguines (y compris globules rouges, globules blancs et plaquettes sanguines), nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, troubles de la fonction hépatique, douleurs musculaires, céphalées, vertiges, malaise	indifférent
<b>Emtricitabine (FTC)</b>	Emtriva		Capsules: 200 mg	200 mg, 1x/j	<b>1</b>	Céphalées, diarrhée, nausées, élévation du taux sanguin de créatine kinase, vertiges, éruption cutanée pouvant être due à une réaction allergique, prurit, modification de la couleur de la peau des paumes des mains et/ou des plantes des pieds, faiblesse	indifférent
<b>Ténofovir (TDF)</b>	Viread		Comprimés: 245 mg	245 mg, 1x/j	<b>1</b>	Vertiges, diarrhée, vomissements, nausées, taux sanguins réduits de phosphates, céphalées, douleurs abdominales, sensation de ballonnement, flatulences, fatigue	avec un repas
<b>Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)</b>							
<b>Éfavirenz (EFV)</b>	Stocrin		Comprimés: 600 mg (capsules: 200 mg)	600 mg, 1x/j	<b>1</b>	Éruptions cutanées, nausées, vertiges, diarrhée, céphalées, troubles du sommeil, fatigue, problèmes de concentration, sensation de vertige, insomnies	à jeun, avant le coucher
<b>Étravirine (ETV)</b>	Intence		Comprimés: 100 mg, 200 mg	200 mg, 2x/j	<b>2</b>	Éruption cutanée, diarrhée, nausées, douleurs abdominales, vomissements, brûlures d'estomac, ballonnements, gastrite, épuisement, picotements ou douleurs dans les mains ou dans les pieds	mieux toléré avec un repas
<b>Névirapine (NVP)</b>	Viramune Retard		Comprimés: 400 mg	400 mg 1x/j après une phase initiale de 2 semaines avec la moitié de la dose	<b>1</b>	Éruptions cutanées, altérations du foie, altérations de l'hémogramme, fièvre, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs gastriques, fatigue, somnolence	indifférent
<b>Rilpivirine (RPV)</b>	Edurant*		Comprimés: 25 mg	25 mg, 1x/j	<b>1</b>	Taux élevés de cholestérol, taux élevés d'une enzyme pancréatique, modification d'une valeur hépatique (transaminase), difficultés à s'endormir, troubles du sommeil, céphalées, vertiges, nausées, nombre réduit de globules blancs et/ou de plaquettes sanguines	avec un repas
<b>Inhibiteurs de protéase (IP)</b>							
<b>Atazanavir (ATV)</b>	Reyataz		Capsules: 150 mg, 200 mg et 300 mg	300 mg + 100 mg de RTV, 1x/j	<b>2</b>	Nausées, jaunisse, diarrhée, céphalées, coloration jaune du blanc de l'œil (ictère scléral), troubles gastro-intestinaux, vomissements, éruption cutanée, rougeur cutanée	mieux toléré avec un repas
<b>Darunavir (DRV)</b>	Prezista		Comprimés: 400 mg, 600 mg et 800 mg	800 mg + 100 mg de RTV, 1x/j, <b>ou</b> 600 mg + 100 mg de RTV, 2x/j	<b>2-4</b>	Douleurs abdominales, répartition anormale des tissus adipeux, diarrhées, céphalées, nausées, vomissements, éruption cutanée	avec un repas
<b>Fosamprenavir (FPV)</b>	Telzir		Comprimés: 700 mg	700 mg + 100 mg de RTV, 2x/j	<b>4</b>	Diarrhée, douleurs abdominales, selles molles, nausées, vomissements, vertiges, fatigue, céphalées, éruption cutanée, picotements ou engourdissement au niveau des lèvres et de la bouche	indifférent
<b>Lopinavir/ritonavir (LPV/RTV)</b>	Kaletra		Comprimés: 200 mg de LPV et 50 mg de RTV, <b>ou</b> 100 mg de LPV et 25 mg de RTV	2 cpr. 2x/j <b>ou</b> 4 cpr. 1x/j	<b>4</b>	Douleurs abdominales, selles anormales et diarrhée, sensation de faiblesse ou de fatigue, céphalées, nausées et vomissements	indifférent


\* Edurant est homologué par l'Institut suisse des produits thérapeutiques, mais il n'est pas encore admis aux caisses. Edurant n'est donc pas automatiquement remboursé par l'assurance maladie. Il est important de vous renseigner à l'avance auprès de votre assurance maladie. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet.

Nom générique	Nom commercial	Forme	Dose standard chez l'adulte	Cpr./jour	Effets indésirables fréquents	Prise avec/sans/avant un repas
Ritonavir (RTV)	Norvir	 Comprimés: 100 mg	Pour renforcer («booster») d'autres inhibiteurs de protéase (IP): 100 mg à 200 mg	1-2	Comme le RTV n'est utilisé qu'à faible dose, en association avec d'autres inhibiteurs de protéase, ses effets indésirables éventuels sont indiqués sous ces autres médicaments	avec un repas
Tipranavir (TPV)	Aptivus	 Capsules: 250 mg	500 mg avec 200 mg de RTV, 2x/j	8	Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, distension abdominale, troubles digestifs, ballonnements, selles molles, fatigue, épuisement	avec un repas



### Inhibiteurs de fusion

T-20, enfuvirtide	Fuzeon	 Poudre à dissoudre dans de l'eau	Injection sous-cutanée, 90 mg, 2x/j	-	Réactions au site d'injection, diarrhée, nausées, douleurs et engourdissement des mains, des pieds ou des jambes (neuropathie périphérique), perte de poids, troubles du sommeil, céphalées, sinusite, infection de l'oreille, candidose buccale	indifférent
-------------------	--------	--	-------------------------------------	---	--	-------------








### Inhibiteurs du CCR5

Maraviroc (MVC)	Celsentri	 Comprimés: 150 mg, 300 mg	300 mg 2x/j ou 150 mg 2x/j avec IP boostés (hors TPV: 300 mg 2x/j recommandés), ou 600 mg 2x/j avec EFV ou ETV	2-4	Infections respiratoires supérieures, toux, fièvre, difficultés à s'endormir et à dormir toute la nuit, trouble dépressif, sensation de vertige, anomalies sensorielles telles que fourmillements ou picotements, troubles de la conscience, douleurs neuropathiques	indifférent
-----------------	-----------	---	--	-----	--	-------------

### Inhibiteurs de l'intégrase

Raltégravir (RAL)	ISENTRESS	 Capsules: 400 mg	400 mg, 2x/j	2	Nausées, diarrhée, céphalées, fièvre, toux, infection des voies respiratoires supérieures, inflammations des fosses nasales et de la gorge, fatigue, troubles du sommeil, éruption cutanée	indifférent
Dolutégravir	Tivicay	 Comprimés: 50 mg	1 cpr, 1x/j (sauf lors d'une résistance aux inhibiteurs de l'intégrase, 1 cpr 2x/j)	1 (-2)	Maux de tête, diarrhée, nausées, éruption cutanée, démangeaisons, vomissements, douleurs épigastriques, troubles du sommeil, sensation de vertige, rêves anormaux	indifférent

### Associations fixes

3TC/AZT	Combivir (générique: Lamivudine-Zidovudine Mepha)	 Comprimés: avec 150 mg de 3TC et 300 mg d'AZT	1 cpr., 2x/j	2	cf. 3TC et AZT	indifférent
3TC/ABC	Kivexa	 Comprimés: avec 300 mg de 3TC et 600 mg d'ABC	1 cpr., 1x/j	1	cf. 3TC et ABC	indifférent
3TC/ABC/AZT	Trizivir	 Comprimés: avec 150 mg de 3TC, 300 mg d'ABC et 300 mg d'AZT	1 cpr., 2x/j	2	cf. 3TC, ABC et AZT	indifférent
FTC/TDF	Truvada	 Comprimés: avec 200 mg de FTC et 245 mg de TDF	1 cpr., 1x/j	1	cf. FTC et TDF	avec un repas
FTC/TDF/EFV	Atripla	 Comprimés: avec 200 mg de FTC, 245 mg de TDF et 600 mg d'EFV	1 cpr., 1x/j	1	cf. FTC, TDF et EFV	à jeun
FTC/TDF/RPV	Eviplera	 Comprimés: avec 200 mg de FTC, 245 mg de TDF et 25 mg de RPV	1 cpr., 1x/j	1	cf. FTC, TDF et RPV	avec un repas
FTC/TDF/elvitégravir (EVG)/cobicistat (COBI)	Stribild	 Comprimés: avec 200 mg FTC, 245 mg TDF, 150 mg EVG, 150 mg COBI	1cpr., 1x/j	1	cf. FTC, TDF et notice d'emballage	avec un repas

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s'impose. Néanmoins, l'Aide Suisse contre le Sida et le NAM ne peuvent pas être rendus responsables d'inexactitudes ou d'erreurs dues à des causes hors de leur domaine de responsabilité. Toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils correspondants du médecin.

L'aperçu ne présente qu'une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.), veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d'emballage ou visiter le site Internet [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch).

Vous pouvez télécharger ce document sur [www.shop.aids.ch/seropo](http://www.shop.aids.ch/seropo).

3ème édition remaniée (disponible en ligne) D/F



AIDS-HILFE SCHWEIZ  
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA  
AIUTO AIDS SVIZZERO

Aide Suisse contre le Sida  
Konradstrasse 20, Case postale 1118, 8031 Zurich  
[www.aids.ch](http://www.aids.ch)

Compte pour les dons  
Zurich, compte postal 80-23678-6