

Médicaments anti-VIH actuellement disponibles en Suisse

| Inhibiteurs d'entrée: antagonistes de CCR5 (CCR5A) | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Nom de marque | Principe actif | Posologie mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
| | Maraviroc (MVC) | | Comprimés | | Non autorisé |
| | Vicriviroc (VVC) | | Comprimés | | Non autorisé |

| Inhibiteurs d'entrée: inhibiteurs de la fusion (FI) | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom de marque | Principe actif | Posologie mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
| Fuzeon™ | Enfuvirtide (T-20) | 2×90 | Ampoules | Réactions au site d'injection | Remboursé par les caisses-maladie |

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (NRTI)

| Nom de marque | Principe actif | Posologie mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
|----------------|--|--|---|---|---|
| Retrovir® AZT® | Zidovudine (ZDV, AZT) | 2×250 ou 2×300 | Comprimés Gélules Sirop Ampoules | Anémie Nausées | Remboursé par les caisses-maladie |
| Videx® EC | Didanosine (ddl) | 1×250 (<60 kg) ou 1×400 (>60 kg) | Gélules | Diarrhées Pancréatite | Remboursé par les caisses-maladie A prendre à jeun |
| 3TC® (Epivir®) | Lamivudine (3TC) | 2×150 ou 1×300 | Comprimés Solution | Nausées Céphalées | Remboursé par les caisses-maladie |
| Zerit® | Stavudine (d4T) | 2×30 (<60 kg) 2×40 (>60 kg) | Gélules Poudre | Neuropathies | Remboursé par les caisses-maladie |
| Ziagen® | Abacavir (ABC) | 1×600 ou 2×300 | Comprimés Solution | Réactions d'hypersensibilité Céphalées | Remboursé par les caisses-maladie |
| Emtriva® | Emtricitabine (FTC) | 1×200 | Gélules | Nausées Diarrhées | Remboursé par les caisses-maladie |
| Combivir® | Zidovudine/ lamivudine | 2×300/150 | Comprimés | Cf. zidovudine et lamivudine | Remboursé par les caisses-maladie |
| Trizivir® | Zidovudine/ lamivudine/ abacavir | 2×300/150/300 | Comprimés | Cf. zidovudine, lamivudine et abacavir | Remboursé par les caisses-maladie |
| Kivexa® | Lamivudine/ abacavir | 1×300/600 2×150/300 | | | Remboursé par les caisses-maladie |

Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse (NtRTI)

| Nom de marque | Principe actif | Posologie mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Viread® | Ténofovir (TDF) | 1×300 | Comprimés | Nausées Diarrhées | Remboursé par les caisses-maladie |
| Truvada® | Ténofovir-DF/emtricitabine | 1×300/200 | Comprimés | Voir ténofovir et emtricitabine | Non remboursé par les caisses-maladie |
| Atripla® | Ténofovir-DF/emtricitabine/éfavirenz | 1×300/200/600 | Comprimés | Voir ténofovir, emtricitabine et éfavirenz | Non autorisé, pas pendant la grossesse |

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI)

| Nom de marque | Principe actif | Posologie* mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| Viramune® | Névirapine (NVP) | 2×200 | Comprimés | Eruption cutanée Réaction d'hypersensibilité | Remboursé par les caisses-maladie, dosage progressif |
| Stocrin® (Sustiva®) | Efavirenz (EFV) | 1×600 | Gélules Comprimés Sirop | Vertiges Eruption cutanée | Remboursé par les caisses-maladie A éviter en cas de grossesse |

| Inhibiteurs de la protéase (PI) | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--|---|
| Nom de marque | Principe actif | Posologie* mg/jour | Présentation | Effets indésirables fréquents | Remarques |
| Invirase® | Saquinavir (SQV-HGC) gélatine dure | 2×1000 & RTV 2×100 ou 1×1600 & RTV 1×200 | Gélules | Diarrhées Nausées | Remboursé par les caisses-maladie A prendre avec les repas |
| Crixivan® | Indinavir (IDV) | 2×800 & RTV 2×100 | Gélules | Nausées Calculs rénaux | Remboursé par les caisses-maladie A prendre à jeun ou avec une collation pauvre en graisses |
| Norvir® | Ritonavir (RTV) | 2×100-200 utilisé seulement comme «boosting au ritonavir» | Gélules Sirop | Diarrhées Nausées | Remboursé par les caisses-maladie Dosage progressif |
| Viracept® | Nelfinavir (NFV) | 2×1250 | Comprimés Poudre | Diarrhées Eruption cutanée | Remboursé par les caisses-maladie A prendre avec les repas |
| Telzir™ | Fosamprénavir (FAPV) | 2×(700+100 RTV) | Comprimés | Nausées Diarrhées Eruption cutanée | Remboursé par les caisses-maladie A éviter en cas de grossesse |
| Kaletra® | Lopinavir (LPV) et ritonavir (RTV) | 2×500 (400/100) | Gélules | Diarrhées Nausées | Remboursé par les caisses-maladie A prendre avec les repas |
| Reyataz® | Atazanavir (ATV) | 1×300 & RTV 1×100 | Comprimés | Yeux jaunes | Remboursé par les caisses-maladie A prendre avec les repas, A éviter en cas de grossesse |
| Aptivus® | Tipranavir (TPV) | 2×500 & RTV 2×200 | Comprimés | Diarrhées Nausées | Remboursé par les caisses-maladie A éviter en cas de grossesse |
| Prezista® | Darunavir (DRV) | 2×600 & RTV 2×100 | Comprimés | Diarrhées Nausées | Non enregistré A éviter en cas de grossesse |

* En cas d'administration concomitante d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI), la plupart des inhibiteurs de la protéase doivent se doser différemment et ne peuvent se prendre qu'avec une petite dose de ritonavir seulement. Pris avec un second inhibiteur de la protéase, le ritonavir doit être dosé moins fort (2×100 à 200 mg par jour) et le second autrement qu'indiqué dans le Compendium Suisse des Médicaments. La combinaison de ritonavir avec Kaletra® n'est pas recommandée. La combinaison d'une faible dose de ritonavir avec un inhibiteur de la protéase est en principe utile, même s'il s'agit d'une posologie non enregistrée pour certains antiprotéases (*en italique*), et donne des concentrations

plus élevées et plus efficaces du second inhibiteur de la protéase. Dans le cas de l'indinavir, du fos-amprénavir, du lopinavir, du tipranavir, du darunavir et du saquinavir, l'administration d'une dose quotidienne double est ainsi possible. Dans le cas du fos-amprénavir, du lopinavir et du saquinavir selon les circonstances (posologie non enregistrée [*en italique*]), il s'agit d'une dose quotidienne unique pour les patients n'ayant suivi aucun traitement préalable et, dans le cas de l'atazanavir, d'une dose quotidienne unique, même pour les patients préalablement traités. Des concentrations médicamenteuses supérieures recèlent en principe le risque d'accroître les effets secondaires. Ils est conseillé de consulter un expert en la matière.