


















Aperçu des médicaments antirétroviraux

Les médicaments anti-VIH

Médicaments homologués en Suisse (2017)

Nom générique	Nom commercial	Forme	Dose standard chez l'adulte	Cpr./jour	Effets indésirables pertinents	Prise avec/sans avant un repas	
Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI/INTtI)							
3TC, lamivudine	3TC (générique: Lamivudin Teva)		Comprimés: 150 mg, 300 mg	150 mg, 2 x/j ou 300 mg, 1 x/j	2	Céphalées, diarrhée, vomissements, éruption cutanée, polyneuropathie	indifférent
Abacavir (ABC)	Ziagen		Comprimés: 300 mg	300 mg, 2 x/j ou 600 mg, 1 x/j	2	Réactions d'hypersensibilité, vomissements, céphalées, nausées, diarrhée, manque d'appétit, éruption cutanée	indifférent
AZT, zidovudine	Retrovir AZT		Capsules: 250 mg	250 mg, 2 x/j	2	Altérations de l'hémogramme, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, troubles de la fonction hépatique, douleurs musculaires, céphalées, vertiges, malaise, lipodystrophie, acidose lactique	indifférent
Emtricitabine (FTC)	Emtriva		Capsules: 200 mg	200 mg, 1 x/j	1	Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée, prurit	indifférent
Ténofovir alafénamide (TAF)							

* Edurant est homologué par l'Institut suisse des produits thérapeutiques, mais il n'est pas encore admis aux caisses. Edurant n'est donc pas automatiquement remboursé par l'assurance maladie. Il est important de vous renseigner à l'avance auprès de votre assurance maladie. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet.

Nom générique	Nom commercial	Forme	Dose standard chez l'adulte	Cpr./jour	Effets indésirables pertinents	Prise avec/sans/avant un repas	
Inhibiteurs du CCR5							
Maraviroc (MVC)	Celsenti		Comprimés: 150 mg, 300 mg	300 mg, 2 x/j ou 150 mg, 2 x/j avec IP boostés ou 600 mg, 2 x/j avec EFV ou ETV	2-4	Douleurs abdominales, diarrhée, inflammations musculaires, difficultés à s'endormir et troubles du sommeil, troubles dépressifs, infections des voies respiratoires supérieures, toux	indifférent
Inhibiteurs de l'intégrase							
Dolutégravir	Tivicay		Comprimés: 50 mg	1 cpr., 1 x/j (à l'exception d'une résistance aux inhibiteurs de l'intégrase, 1 cpr. 2x/j)	1 (-2)	Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée, prurit, vomissements, douleurs épigastriques, troubles du sommeil, sensation de vertiges, rêves anormaux, dépression	indifférent
Elvitégravir/cobicistat (EVG/Cobi)	Uniquement disponible sous forme d'association fixe		Comprimés: avec 150 mg d'EVG et 150 mg de Cobi	1 cpr., 1 x/j	1	Nausées, diarrhée, rêves anormaux, céphalées	avec un repas
Raltégravir (RAL)	Isetress		Comprimés: 400 mg	400 mg, 2 x/j	2	Nausées, diarrhée, céphalées, troubles du sommeil, éruption cutanée	indifférent
Associations fixes							
3TC/ABC	Kivexa		Comprimés: avec 300 mg de 3TC et 600 mg d'ABC	1 cpr., 1 x/j	1	cf. 3TC et ABC	indifférent
3TC/ABC/AZT	Trizivir		Comprimés: avec 150 mg de 3TC, 300 mg d'ABC et 300 mg d'AZT	1 cpr., 2 x/j	2	cf. 3TC, ABC et AZT	indifférent
3TC/ABC/DTG	Triumeq		Comprimés: avec 300 mg de 3TC, 600 mg d'ABC et 50 mg de DTG	1 cpr., 1 x/j	1	cf. 3TC, ABC et DTG	indifférent
3TC/AZT	Combivir (générique: Lamivudine-Zidovudine Mepha)		Comprimés: avec 150 mg de 3TC et 300 mg d'AZT	1 cpr., 2 x/j	2	cf. 3TC et AZT	indifférent
FTC/TAF	Descovy		Comprimés: avec 200 mg de FTC et 10 mg ou 25 mg de TAF	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC et TAF	indifférent
FTC/TAF/EVG/Cobi	Genvoya		Comprimés: avec 200 mg de FTC, 10 mg de TAF, 150 mg d'EVG et 150 mg de Cobi	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC, TAF, EVG et Cobi	avec un repas
FTC/TDF	Truvada		Comprimés: avec 200 mg de FTC et 245 mg de TDF	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC et TDF	avec un repas
FTC/TDF/EFV	Atripla		Comprimés: avec 200 mg de FTC et 245 mg de TDF et 600 mg d'EFV	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC, TDF et EFV	à jeun
FTC/TDF/EVG/Cobi	Stribild		Comprimés: avec 200 mg de FTC, 245 mg de TDF, 150 mg d'EVG, 150 mg de Cobi	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC, TDF, EVG et Cobi	avec un repas
FTC/TDF/RPV	Eviplera		Comprimés: avec 200 mg de FTC, 245 mg de TDF et 25 mg de RPV	1 cpr., 1 x/j	1	cf. FTC, TDF et RPV	avec un repas

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s'impose. Néanmoins, l'Aide Suisse contre le Sida et le NAM ne peuvent pas être rendus responsables d'inexactitudes ou d'erreurs dues à des causes hors de leur domaine de responsabilité. Toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils correspondants du médecin.

L'aperçu ne présente qu'une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.), veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d'emballage ou visiter le site Internet www.swissmedinfo.ch.

Vous pouvez télécharger le tableau à l'adresse www.shop.aids.ch/seropo.

d: 4^e édition actualisée en 2017 (disponible en ligne) D/F



AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

Aide Suisse contre le Sida
Staufferacherstrasse 101, Case postale 9870, 8036 Zurich
www.aids.ch

Compte pour les dons
Zurich, compte postal
30-10900-5